

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Acerin, (195 mg + 98 mg)/g, płyn na skórę
Acidum salicylicum + Acidum (S)-lacticum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Acerin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acerin
3. Jak stosować lek Acerin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Acerin
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Acerin i w jakim celu się go stosuje

Lek Acerin ma postać płynu do stosowania na skórę. Zawiera dwie substancje czynne – kwas salicylowy i kwas (S)-mlekowy.

Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie.

Kwas (S)-mlekowy jest środkiem złuszczącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

Wskazania

Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acerin

Kiedy nie stosować leku Acerin

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas salicylowy, kwas (S)-mlekowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli pacjent ma cukrzycę,
- jeśli pacjent ma zaburzenia układu krążenia,
- jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo,
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat,
- doustnie,
- na twarz i w okolicy narządów płciowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Acerin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Jeśli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry należy przerwać leczenie.
- Należy chronić oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem oraz jego

- oparami. Jeśli przypadkowo dostanie się on do oczu lub błon śluzowych, należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- Należy zabezpieczyć skórę otaczającą odcisk przed kontaktem z lekiem, gdyż może on spowodować oparzenia. Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zrogowaciałą skórę.
 - Nie należy stosować leku na niezmienioną, zdrową skórę ani na uszkodzoną skórę, ponieważ kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane (dotyczące całego organizmu). Jeśli dojdzie do pokrycia lekiem zdrowej skóry otaczającej odcisk, należy natychmiast przemyć ją wodą.
 - Nie należy stosować tego leku z innymi lekami zawierającymi kwas salicylowy i kwas (S)-mlekowy.
 - Lek jest łatwopalny. Nie wolno stosować leku w pobliżu otwartego ognia, zapalonego papierosa lub niektórych urządzeń (na przykład suszarki do włosów).

Dzieci

Leku Acerin nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Lek Acerin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania leku Acerin w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Acerin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Acerin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Acerin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Po aplikacji należy dokładnie umyć ręce (chyba że zmiana zlokalizowana jest na dłoni).

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Lek Acerin należy stosować 1 lub 2 razy na dobę, nakładając cienką warstwę wyłącznie na odcisk lub zgrubiałą skórę przy użyciu dołączonego pędzelka.

Należy uważać, aby nie nanieść leku na zdrową skórę, otaczającą zmianę. Po aplikacji należy poczekać aż lek całkowicie wyschnie i utworzy film ochronny. W razie potrzeby lek można stosować przez kilka dni, maksymalnie 2 tygodnie. Następnie należy wymoczyć nogi i ostrożnie usunąć odcisk. Raz w tygodniu, przed kolejną aplikacją leku, zaleca się delikatnie usunąć zmiękczoną, martwą warstwę naskórka (np. za pomocą pilnika lub pumeksu).

Należy uważać, aby nie dopuścić do kapania płynu z pędzelka i do rozlania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci

Lek Acerin może być stosowany u dzieci w wieku od 2 do 12 lat, po konsultacji i pod kontrolą lekarza.

Leku nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acerin

Brak danych o przedawkowaniu leku w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

W razie przypadkowego spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Acerin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy podrażnienia i stan zapalny.

Zastosowanie leku na zdrową skórę może spowodować oparzenie i ból. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49-21-301

Faks: + 48 22 49-21-309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Acerin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i etykiecie butelki. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym pomieszczeniu.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek jest łatwopalny. Ostrożnie z ogniem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Acerin

- Substancjami czynnymi leku są kwas salicylowy i kwas (S)-mlekowy. 1 g płynu na skórę zawiera 195 mg kwasu salicylowego i 98 mg kwasu (S)-mlekowego.
- Pozostałe składniki to: celulozy octanofitalan, kalafonia, aceton, octan n-butyłu.

Jak wygląda lek Acerin i co zawiera opakowanie

Lek Acerin jest w postaci płynu na skórę.

Opakowanie leku to butelka z bezbarwnego szkła z polipropylenową zakrętką, zaopatrzoną w aplikator z pędzelkiem, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 8 g płynu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Tel. + 48 42 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki: