

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vicks AntiGrip Dzień i Noc

500 mg + 60 mg, tabletki powlekane

Paracetamol + Pseudoephedrini hydrochloridum

500 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Paracetamol + Diphenhydramini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Vicks AntiGrip Dzień i Noc i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc
3. Jak stosować lek Vicks AntiGrip Dzień i Noc
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Vicks AntiGrip Dzień i Noc
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vicks AntiGrip Dzień i Noc i w jakim celu się go stosuje

Vicks AntiGrip Dzień i Noc zawiera paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, pseudoefedrynę o działaniu zmniejszającym przekrwienie błony śluzowej nosa oraz difenhydraminę, lek przeciwhistaminowy powodujący senność.

- Paracetamol łagodzi bóle ciała, ból głowy i gorączkę.
- Pseudoefedryna działa na naczynia krwionośne w nosie łagodząc przekrwienie błony śluzowej nosa.
- Difenhydramina łagodzi objawy kataru, kichania, oczyszcza nos z wydzieliny i jest odpowiednia do stosowania w porze nocnej.

Vicks AntiGrip Dzień i Noc jest wskazany w krótkotrwałym objawowym leczeniu przekrwienia błony śluzowej nosa i zatok związanego z objawami przeziębienia i grypy, takimi jak ból, ból głowy i(lub) gorączka, wyłącznie w przypadkach, gdy w czasie pory snu pojawia się również ból, który uniemożliwia zasypianie.

Vicks AntiGrip Dzień i Noc jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat.

Opakowanie zawiera dwa rodzaje tabletek, w różnych kolorach, do stosowania w różnych porach doby. Należy uważnie przeczytać ulotkę dla pacjenta, aby przyjmować właściwe tabletki o odpowiedniej porze doby.

- „Tabletki na dzień”: żółte tabletki zawierają paracetamol i pseudoefedrynę - do stosowania w ciągu dnia.
- „Tabletki na noc”: niebieskie tabletki zawierają paracetamol i difenhydraminę - do stosowania na noc.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc

Kiedy nie stosować leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc:

- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na paracetamol, pseudoefedrynę, difenhydraminę lub którykolwiek ze składników leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli u pacjenta występuje bardzo wysokie ciśnienie krwi (ciężkie nadciśnienie) lub nadciśnienie, które nie jest leczone;
- jeśli pacjent przeszedł udar mózgu spowodowany krwawieniem w części mózgu;
- jeśli pacjent ma chorobę serca lub występuje u niego przyspieszone tętno;
- jeśli pacjent przyjmuje beta-blokery;
- jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminoooksydazy (MAOI, stosowane w leczeniu choroby Parkinsona lub depresji) bądź przyjmował je w ciągu ostatnich 14 dni;
- jeśli pacjent przyjmuje inne sympatykomimetyczne leki zmniejszające przekrwienie (w tym zmniejszające przekrwienie śluzówki nosa);
- jeśli pacjent ma cukrzycę;
- jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny (rzadki guz wpływający na częstość akcji serca lub ciśnienie tętnicze krwi);
- jeśli u pacjenta występuje jaskra (zwiększone ciśnienie w gałce ocznej);
- jeśli u pacjenta występuje ciężka ostra (nagła) lub przewlekła (długotrwała) choroba nerek lub niewydolność nerek;
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby
- jeśli u pacjenta występują trudności z oddawaniem moczu i(lub) przerost gruczołu krokowego;
- jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy;
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

NIE stosować leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Difenhydramina może powodować senność. NIE należy przyjmować niebieskich tabletek w ciągu dnia.

W celu uniknięcia przedawkowania NIE należy przyjmować innych leków zawierających paracetamol, leków obkurczających naczynia lub leków przeciwhistaminowych, w tym o działaniu miejscowym i innych leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu.

Należy unikać spożywania napojów alkoholowych podczas stosowania tego leku.

Podczas stosowania leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc może wystąpić nagły ból brzucha lub krwawienie z odbytu w wyniku stanu zapalnego jelita grubego (niedokrwienne zapalenie jelita grubego). Jeśli wystąpią takie objawy dotyczące przewodu pokarmowego, należy przerwać stosowanie leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną. Patrz punkt 4.

Po zastosowaniu leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc może wystąpić zmniejszenie dopływu krwi do nerwu wzrokowego. Jeśli wystąpi nagła utrata wzroku, należy zaprzestać przyjmowania leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną. Patrz punkt 4.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

- pacjent przyjmuje środki przeciwdepresyjne (środki nasenne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpyschotyczne i uspokajające);
- u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby (np. zespół Gilberta);
- pacjent przyjmuje leki zaburzające czynność wątroby;
- u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (fawizm);
- u pacjenta występuje niedobór glutationu (antyoksydant);
- u pacjenta występuje anemia;

- pacjent jest odwodniony;
- pacjent jest przewlekłe niedożywiony;
- pacjent waży poniżej 50 kg;
- pacjent jest w podeszłym wieku;
- pacjent ma nadciśnienie tętnicze;
- u pacjenta występuje astma, przewlekły kaszel, rozedma płuc (choroba płuc) lub skurcz mięśni w drogach oddechowych (skurcz oskrzeli);
- pacjent cierpi na alkoholizm, ponieważ regularne spożywanie alkoholu niekorzystnie wpływa na czynność wątroby i może zwiększać ryzyko toksycznego działania na wątrobę leków zawierających paracetamol;
- u pacjenta występuje psychoza
- u pacjenta występuje niedrożność tętnic i żył (choroba zarostowa naczyń krwionośnych);
- u pacjenta występuje niedrożność żołądka lub zmiany w oddawaniu moczu, takie jak zmniejszony przepływ, niepełne opróżnianie, zwiększona częstotliwość, ból i dyskomfort.

W trakcie stosowania leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby, w tym ciężkie zaburzenia czynności nerek lub posocznica (gdy we krwi krążą bakterie i ich toksyny, prowadząc do uszkodzenia narządów) lub niedożywienie, przewlekły alkoholizm, lub gdy pacjent przyjmuje również flukloksacynę (antybiotyk). W tych sytuacjach notowano u pacjentów występowanie ciężkiej choroby o nazwie kwasica metaboliczna (nieprawidłowość krwi i płynów ustrojowych), gdy stosowali oni paracetamol w regularnych dawkach przez dłuższy czas lub gdy przyjmowali paracetamol wraz z flukloksacyną. Objawy kwasicy metabolicznej mogą obejmować: poważne trudności z oddychaniem, w tym przyspieszone głębokie oddychanie, senność, uczucie mdłości (nudności) i wymioty.

Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka z uogólnionym rumieniem skóry i wysypką kropkową, należy przerwać przyjmowanie leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz punkt 4.

Po zastosowaniu leków zawierających pseudoefedrynę zgłaszano przypadki zespołu tylnej odwracalnej encefalopatii (PRES) oraz zespołu odwracalnego zwężenia naczyń mózgowych (RCVS). PRES i RCVS to rzadkie schorzenia, które mogą wiązać się ze zmniejszonym dopływem krwi do mózgu.

W przypadku wystąpienia objawów, które mogą być objawami PRES lub RCVS, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską (objawy, patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Dzieci i młodzież

Vicks AntiGrip Dzień i Noc NIE WOLNO stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Vicks AntiGrip Dzień i Noc a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to szczególnie istotne, aby poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli pacjent przyjmuje któryś z niżej wymienionych leków, ponieważ ich działanie może ulec zmianie:

- leki przeciwdepresyjne (np. MAOI w tym moklobemid i brofaromina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, w tym amitryptylina);
- leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, w tym guanetydyna, debryzochina, metylodopa, rezerpina, leki blokujące receptory alfa– i beta–adrenergiczne;
- inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki hamujące apetyt i stymulanty typu amfetaminy;
- lek przeciwdepresyjny zwany inhibitorem monoaminooksydazy (MAOI). Nie należy przyjmować tego leku, jeśli pacjent przestał przyjmować lek z grupy MAOI w ciągu ostatnich 14 dni. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza lub farmaceutę (patrz sekcja „inne leki” poniżej);
- leki powodujące uszkodzenie wątroby, takie jak leki przeciwdrgawkowe stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina, karbamazapina, fenobarbital, lamotrygina);

- leki stosowane w leczeniu gruźlicy (izoniazyd, ryfamipicyna);
- leki stosowane w leczeniu wirusa HIV (zydowudyna, rytonawir);
- antybiotyki, takie jak chloramfenikol, linezolid;
- leki stosowane w leczeniu dny moczanowej np. probenecyd;
- metoklopramid lub domperidon (stosowane w leczeniu nudności i wymiotów), leki zobojętniające kwas solny (stosowane w leczeniu zgagi);
- kaolin (krótkotrwałe leczenie objawowe różnych stanów, w tym biegunki, suchości skóry) lub węgiel aktywowany;
- kolestyramina (lek obniżający stężenie cholesterolu);
- leki przeciwzakrzepowe (rozrzedzające krew) jak warfaryna;
- alkohol lub leki, które powodują senność, takie jak leki hamujące OUN (np. leki uspokajające, nasenne, opioidowe leki przeciwbólowe i leki przeciwlękowe);
- leki antycholinergiczne (leki wpływające na układ nerwowy), takie jak atropina;
- alkaloidy sporyszu, takie jak leki stosowane w leczeniu migreny, np. ergotamina i metysergid;
- glikozydy nasercowe (np. digoksyna) stosowane w leczeniu chorób serca;
- halogenowe środki znieczulające, jak cyklopropan, halotan, enfluran, izofluran;
- salicylany/ kwas acetylosalicylowy (aspiryna);
- inhibitory izoenzymu CYP2D6 cytochromu P450, takie jak metoprolol i wenlafaksyna;
- leki przeciwarytmiczne, przeciimalaryczne lub leki, które mogą wywoływać obniżenie stężenia potasu we krwi (np. niektóre leki moczopędne);
- flukloksacylina (antybiotyk), ze względu na poważne ryzyko zaburzeń krwi i płynów ustrojowych (nazywanych kwasicą metaboliczną), które muszą być pilnie leczone (patrz punkt 2).

Wpływ leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc na wyniki badań laboratoryjnych

Leki zawierające paracetamol mogą wpływać na wyniki oznaczeń kwasu moczowego i glukozy we krwi.

Leki zawierające pseudoefedrynę mogą wpływać na wyniki testów dopingowych u sportowców.

Leki zawierające pseudoefedrynę mogą wpływać na wyniki testów skórnych. Ten lek nie powinien być przyjmowany co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem testu skórnych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować Vicks AntiGrip Dzień i Noc w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Płodność

Wpływ niniejszego leku na płodność nie został dokładnie zbadany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Tabletka na noc:

Tabletka na noc zawiera difenhydraminę, która może powodować senność lub ospałość. Może również wywoływać zawroty głowy, niewyraźne widzenie, zaburzenia funkcji poznawczych i psychomotorycznych. Takie działanie może w istotny sposób zaburzać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. W przypadku wystąpienia powyższych objawów NIE wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Tabletka na dzień:

Tabletka na dzień zawiera pseudoefedrynę, w wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić zawroty głowy lub omamy, dlatego każda osoba zamierzająca prowadzić pojazdy powinna wziąć to pod uwagę.

Vicks AntiGrip Dzień i Noc zawiera sól

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletce, co oznacza, że jest uznawany za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Vicks AntiGrip Dzień i Noc

Vicks AntiGrip Dzień i Noc należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka wynosi:

Dorośli i młodzież w wieku 15 lat i powyżej:

Powinno się przyjmować cztery tabletki na dobę według poniższej instrukcji.

Czas dawkowania	Tabletka	Dawka
Dzień	Żółta tabletka	1 żółta tabletka na dzień co 4-6 godzin 3 razy na dobę (po jednej tabletki rano, w środku dnia oraz po południu)
Noc	Niebieska tabletka	1 niebieska tabletka na noc przed pójściem spać

Wolno przyjmować tylko jedną tabletkę na raz, wyłącznie w porze dnia wskazanej na opakowaniu.

NIE wolno przyjmować więcej niż 3 żółte tabletki na dobę (w ciągu dnia).

NIE wolno przyjmować niebieskiej tabletki (przeznaczonej na noc) w ciągu dnia. Nie należy przyjmować więcej niż 1 niebieskiej tabletki na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

NIE wolno podawać leku dzieciom w wieku poniżej 15 lat.

Droga i sposób podawania

Wyłącznie do stosowania doustnego.

Tabletki połykać w całości (bez rozgryzania) i popić odpowiednią ilością płynu.

Czas trwania leczenia

Niniejszy lek jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Nie należy przyjmować leku dłużej niż 4 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc

Jeżeli pacjent lub inna osoba przypadkowo przyjął większą niż zalecana dawkę leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc, **należy natychmiast zwrócić się do lekarza**.

Należy skontaktować się z lekarzem **natychmiast**, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ zbyt duża dawka paracetamolu może wywołać opóźnione, poważne uszkodzenie wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc

Niniejszy lek należy przyjmować dokładnie według wyżej wymienionych instrukcji dawkowania. NIE należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

- Ciężkie schorzenia wpływające na naczynia krwionośne w mózgu, znane jako zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (PRES) oraz zespół odwracalnego zwężenia naczyń mózgowych (RCVS).

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, jeżeli wystąpią objawy wskazujące na zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (PRES) oraz zespół odwracalnego zwężenia naczyń mózgowych (RCVS). Należą do nich:

- silny ból głowy o nagłym początku,
- nudności,
- wymioty,
- splątanie,
- drgawki,
- zmiany widzenia.

Należy natychmiast PRZERWAĆ stosowanie leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc i zwrócić się po pomoc lekarską w przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych objawów: reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona i skurcz oskrzeli*, wysypki skórne (mogą charakteryzować się ciężkim przebiegiem i obejmować powstawanie pęcherzy i łuszczenie naskórka), świąd, pokrzywka, obrzęk twarzy, zaczerwienienie, obrzęk warg, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, zwiększoną liczbę krwawień z nosa lub zauważenie, że łatwiej powstają siniaki lub krwawienia, udar, omdlenie z obniżeniem ciśnienia krwi, zawał serca lub spadek przepływu krwi do serca. Bardzo rzadko zgłaszano silne reakcje skórne.

* Zgłaszano przypadki skurczu oskrzeli po przyjęciu paracetamolu, ale istnieje większe prawdopodobieństwo jego wystąpienia u astmatyków wrażliwych na aspirynę lub inne NLPZ.

Należy PRZERWAĆ stosowanie leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc i natychmiast zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia następujących objawów:

- u małej liczby osób stwierdzono występowanie omamów, jednak występuje to rzadko;
 - niepokój lub zaburzenia snu;
 - zgłaszano rzadkie przypadki zaburzeń krwi, jednak niekoniecznie były one związane ze stosowaniem paracetamolu;
 - zaburzenia czynności wątroby, które mogą powodować żółtolenie oczu lub skóry (żółtaczkę) oraz ciemnienie moczu;
 - wpływ na czynność serca, np. nieregularna lub przyspieszona akcja serca (tachykardia);
 - zwiększenie ciśnienia krwi;
 - u niewielkiej liczby mężczyzn, w szczególności z problemami z prostatą, mogą wystąpić trudności w oddawaniu moczu;
 - nagła gorączka, zaczerwienienie skóry lub liczne niewielkie krostki (możliwe objawy ostrej uogólnionej osutki krostkowej - AGEP, ang. Acute Generalized Exanthematous Pustulosis) mogą wystąpić w ciągu pierwszych 2 dni stosowania leku Vicks AntiGrip Dzień i Noc. Patrz punkt 2.
- Należy zaprzestać stosowania pseudoefedryny, jeśli wystąpią te objawy i skontaktować się z lekarzem lub natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.**

Inne działania niepożądane mogą obejmować:

- trudności z zaśnięciem;
- senność (alkohol, środki uspokajające i nasenne mogą nasilać efekt senności), zawroty głowy, niewyraźne widzenie, rozszerzone źrenice, suchość oczu, ból głowy;
- pragnienie, suchość w ustach, nosie i gardle;
- ból żołądka, biegunkę, nudności, wymioty, ból brzucha, zaparcia, utratę apetytu;
- uczucie zmęczenia;
- splątanie, szczególnie u osób w podeszłym wieku, niepokój, nerwowość, zmniejszoną koncentrację, chwiejność, lęk;
- drgawki, mrowienie lub zdrętwienie (uczucie klucia), dyskinezy (niekontrolowane, mimowolne ruchy twarzy, rąk lub nóg), drżenia;
- drżenie mięśni, pobudzenie, nieodpartą potrzebę poruszania nogami i innymi kończynami (zespół niespokojnych nóg);
- zapalenie jelita grubego spowodowane niewystarczającym przepływem krwi (niedokrwienne zapalenie jelita grubego);

- zmniejszony dopływ krwi do nerwu wzrokowego (niedokrwienna neuropatia wzrokowa), który może powodować utratę wzroku lub problemy z ostrością widzenia - częstość nieznana;
- gęstszy śluz oskrzelowy, kołatanie serca, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, co może prowadzić do niepokoju lub objawów psychiatrycznych;
- znaczne zmniejszenie liczby krwinek, co zwiększa ryzyko infekcji;
- zwiększenie poziomu cukru we krwi;
- zwiększenie poziomu enzymów wątrobowych (transaminaz), wykryte w badaniu krwi;
- poważny stan, który może powodować zwiększenie kwasowości krwi (zwany kwasicią metaboliczną) u pacjentów z ciężką chorobą stosujących paracetamol (patrz punkt 2) – częstość nieznana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vicks AntiGrip Dzień i Noc

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vicks AntiGrip Dzień i Noc:

- Substancjami czynnymi w tabletkach na dzień są paracetamol (500 mg na tabletkę) i chlorowodorek pseudoefedryny (60 mg na tabletkę).
- Substancjami czynnymi w tabletkach na noc są paracetamol (500 mg na tabletkę) i chlorowodorek difenhydraminy (25 mg na tabletkę).
- Inne składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, kopowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian,

Otoczka tabletki na dzień:

Mieszanina powlekająca SheffCoat Brilliant Yellow o składzie: hypromeloza, talk (E553b), triocetan glicerolu (E1518), pigment perłowy na bazie miki (krzemian glinowo-potasowy (E 555)-(mika) i tytanu dwutlenek (E 171)), tlenek żelaza żółty (E172)

Otoczka tabletki na noc:

Mieszanina powlekająca SheffCoat Brilliant Blue o składzie: hypromeloza, talk (E553b), triocetan glicerolu (E1518), pigment perłowy na bazie miki (krzemian glinowo-potasowy (E 555)-(mika) i tytanu dwutlenek (E 171)), indygotyna, lak glinowy (E132).

Jak wygląda lek Vicks AntiGrip Dzień i Noc i co zawiera opakowanie

Tabletki na dzień: żółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane (przybliżone wymiary 9 mm x 18 mm).

Tabletki na noc: niebieskie, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane ze ściętymi ukośnie krawędziami (przybliżona średnica 12 mm).

Wielkość opakowania: 16 tabletek powlekanych (12 tabletek powlekanych na dzień i 4 tabletki powlekane na noc) pakowanych w blister PVC/PCTFE/Aluminium zabezpieczający przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

WICK-Pharma-Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Strasse 40
65824 Schwalbach am Taunus
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Procter & Gamble Health Poland Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa
tel. 801 25 88 25

Wytwórca

P&G Health Austria GmbH & Co. OG
Hösslgasse 20
9800 Spittal an der Drau
Austria

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującym nazwami:

Polska	Vicks AntiGrip Dzień i Noc
Niemcy	WICK DayNait Filmtabletten
Estonia	Wipar
Włochy	Vicks Flu Giorno Notte
Litwa	Wipar 500mg/60mg+500mg/25mg plėvele dengtos tabletės
Łotwa	Wipar 500 mg/60mg + 500 mg/25 mg apvalkotās

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 9/2025