

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Alprazolam Grindeks, 0,25 mg, tabletki

Alprazolam Grindeks, 0,5 mg, tabletki

Alprazolam Grindeks, 1 mg, tabletki

Alprazolamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Alprazolam Grindeks i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alprazolam Grindeks
3. Jak stosować lek Alprazolam Grindeks
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Alprazolam Grindeks
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Alprazolam Grindeks i w jakim celu się go stosuje

Lek Alprazolam Grindeks ma działanie uspokajające i należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami.

Lek Alprazolam Grindeks jest stosowany w leczeniu objawów stanów lękowych u osób dorosłych, w sytuacjach, w których objawy są nasilone, uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta. Ten lek jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alprazolam Grindeks

Kiedy nie stosować leku Alprazolam Grindeks

- jeśli pacjent ma uczulenie na alprazolam, inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli u pacjenta występuje choroba zwana miastenią, charakteryzująca się słabymi i szybko męczącymi się mięśniami,
- jeśli u pacjenta występują znaczne problemy z klatką piersiową lub trudności w oddychaniu (np. przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc),
- jeśli u pacjenta występuje bezdech senny - jest to stan, w którym oddech staje się nieregularny, nawet zatrzymuje się na krótki okres, podczas snu,
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Alprazolam Grindeks należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent nadużywa lub w przeszłości nadużywał alkoholu, narkotyków lub leków,
- jeśli lek jest stosowany długotrwale, gdyż jego działanie może ulec osłabieniu,

- jeśli pacjent jest osłabiony,
- jeśli u pacjenta występują problemy dotyczące płuc, nerek lub wątroby,
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych.

Uzależnienie

Stosowanie leku Alprazolam Grindeks może prowadzić do fizycznego i psychicznego uzależnienia od tego leku. Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki i długości leczenia. W związku z tym leczenie powinno trwać tak krótko, jak jest to możliwe. Ten lek należy stosować w dawce zalecanej przez lekarza (patrz punkt 3). Uzależnienie psychiczne objawia się brakiem chęci zaprzestania przyjmowania leku. Zależność fizyczna oznacza wystąpienie objawów odstawienia po nagłym przerwaniu leczenia tym lekiem. Ryzyko uzależnienia jest również większe u pacjentów, którzy nadużywają lub w przeszłości nadużywali alkoholu lub leków (patrz punkt 3. „Przerwanie stosowania leku Alprazolam Grindeks”). Nadużywanie leków jest częstym czynnikiem ryzyka związanym z lekiem Alprazolam Grindeks. Nadużywanie tego leku może prowadzić do przedawkowania i śmierci. Ten lek należy zawsze stosować w dawce zalecanej przez lekarza. Lek ten może być poszukiwany przez osoby nadużywające leków na receptę i powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla innych osób.

Zaburzenia pamięci

Podczas leczenia alprazolamem pamięć może ulec pogorszeniu. Zwykle ma to miejsce kilka godzin po zażyciu leku. W razie wystąpienia takiego objawu należy skontaktować się z lekarzem. W celu zmniejszenia ryzyka, należy upewnić się, że pacjent będzie miał zapewniony nieprzerwany sen nocny (przez 7-8 godzin) podczas przyjmowania tego leku.

Zaburzenia psychiczne (psychoza)

Jeśli u pacjenta występuje psychoza, poważne zaburzenie psychiczne wpływające na zachowanie, działania i samokontrolę, nie zaleca się stosowania leku Alprazolam Grindeks.

Wpływ na nastrój

Stosowanie alprazolamu może zwiększać ryzyko występowania epizodów hipomanii (łagodniejsza postać manii) i manii (stan nadpobudliwości umysłowej, nadmierne podekscytowanie i wzmożona energia) u pacjentów z depresją. W razie wystąpienia objawów hipomanii lub manii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Depresja, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa

U pacjentów z depresją, leczenie alprazolamem może zwiększać ryzyko wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa. Przed rozpoczęciem leczenia alprazolamem należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli leczenie alprazolamem jest konieczne, a pacjent ma depresję lub miał w przeszłości myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze, lekarz powinien uważnie monitorować stan pacjenta. Należy **natychmiast** skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala, jeśli wystąpią jakiegokolwiek myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa.

Osoby w podeszłym wieku

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania alprazolamu u osób w podeszłym wieku, ponieważ może on powodować nadmierne zmęczenie i (lub) osłabienie mięśni, co może zwiększać ryzyko upadków.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie potwierdzono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego leku.

Lek Alprazolam Grindeks a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Skuteczność leczenia może ulec zmianie, jeśli lek Alprazolam Grindeks jest stosowany jednocześnie z innymi lekami wykorzystywanymi w leczeniu wymienionych stanów. W takim przypadku lekarz może dostosować sposób dawkowania.

- Problemy psychiczne (leki przeciwpsychotyczne, w tym kłozapina)
- Zaburzenia snu (tabletki nasenne)
- Alergie lub katar sienny (niektóre leki przeciwhistaminowe)
- Planowana poważna operacja (leki znieczulające)
- Silny ból (silne leki przeciwbólowe, np. dekstropropoksyfen)
- Terapia uzależnienia od narkotyków (leczenie substytucyjne)
- Problemy takie jak stany lękowe lub depresja, w tym niektóre leki przeciwdepresyjne zawierające fluoksetynę, fluwoksaminę, nefazodon lub imipraminę
- Niewydolność serca (digoksyna)
- Infekcje (antybiotyki zawierające erytromycynę, klarytromycynę i telitromycynę)
- Infekcje grzybicze (itakonazol, flukonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol)
- Leki wykorzystywane w leczeniu dławicy piersiowej i nadciśnienia, takie jak diltiazem
- HIV i AIDS (leki zwane inhibitorami proteazy wirusa HIV, takie jak rytonawir)
- Zgaga i wrzody żołądka, leki takie jak cymetydyna lub omeprazol
- Astma i zapalenie oskrzeli, leki takie jak teofilina
- Padaczka, leki takie jak karbamazepina
- Leki zwiotczające mięśnie. Jednoczesne stosowanie takich leków z alprazolamem może nasilać działanie zwiotczające mięśnie i zwiększać ryzyko upadku

Jednoczesne stosowanie leku Alprazolam Grindeks i opioidów (silne leki przeciwbólowe, leki stosowane w leczeniu substytucyjnym i niektóre leki na kaszel) zwiększa ryzyko senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki i może zagrażać życiu. Z tego powodu jednoczesne stosowanie powinno być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy inne opcje leczenia nie są możliwe. Jednakże, jeśli lekarz przepisze lek Alprazolam Grindeks razem z opioidami, powinien ograniczyć dawkę i czas trwania równoczesnego leczenia.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach opioidowych i ściśle przestrzegać dawki leku zaleconej przez lekarza. Pomocne może być poinformowanie znajomych lub krewnych, aby byli świadomi wyżej wymienionych objawów. W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Na działanie lecznicze alprazolamu może wpływać również jednoczesne stosowanie któregośkolwiek z wymienionych leków: „pigułki” (złożonej doustnej pigułki antykoncepcyjnej), ryfampicyny (stosowana w leczeniu infekcji) lub dziurawca zwyczajnego (preparat ziołowy).

Lek Alprazolam Grindeks z alkoholem

Należy powstrzymać się od picia alkoholu podczas stosowania leku Alprazolam Grindeks, ponieważ alkohol może zmieniać i nasilać działanie leku Alprazolam Grindeks w nieprzewidywalny sposób.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza. Obserwacje u ludzi wskazują, że stosowanie alprazolamu może być szkodliwe dla płodu (zwiększone ryzyko wystąpienia wad rozwojowych (rozszerzenie podniebienia). W czasie ciąży alprazolam może być stosowany tylko wtedy, gdy lekarz stwierdzi, że korzyści z leczenia przewyższają ryzyko dla nienarodzonego dziecka i że lek jest odpowiedni dla pacjentki. Jeśli pacjentka stosuje lek Alprazolam Grindeks do dnia porodu, powinna poinformować o tym lekarza, ponieważ u noworodka mogą wystąpić niektóre objawy odstawienia.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Alprazolam Grindeks w okresie karmienia piersią. Alprazolam przenika do mleka matki. Jeśli lekarz zdecyduje, że pacjentka powinna przyjmować ten lek, należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nawet w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami, lek Alprazolam Grindeks może wpływać na szybkość reakcji w stopniu zaburzającym zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Ryzyko to jest szczególnie wysokie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, w przypadku niewystarczającej ilości snu lub spożywania alkoholu lub przyjmowania innych substancji działających na ośrodkowy układ nerwowy. Należy więc całkowicie powstrzymać się od prowadzenia pojazdów, obsługiwanie maszyn lub podejmowania innych ryzykownych działań, przynajmniej podczas kilku pierwszych dni leczenia. Decyzję w każdym indywidualnym przypadku podejmuje lekarz prowadzący.

Lek Alprazolam Grindeks zawiera laktozę, sól i sodu benzoesan (E 211)

Laktoza:	Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Sód:	Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
Sodu benzoesan:	Lek zawiera 0,12 mg sodu benzoesanu w każdej tabletkie.

3. Jak stosować lek Alprazolam Grindeks

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, obowiązują następujące wytyczne dotyczące dawkowania

Dawka początkowa: zwykle dawka na początku leczenia wynosi od 0,25 do 0,5 mg alprazolamu trzy razy na dobę.

Dawka podtrzymująca: jeśli jest to uzasadnione klinicznie, lekarz może zwiększyć dawkę do od 3 do 4 mg w małych odstępach czasu, podzielonych na kilka pojedynczych dawek.

Pacjenci w podeszłym wieku, szczególnie wrażliwi lub pacjenci osłabieni

Pacjenci w podeszłym wieku i szczególnie wrażliwi oraz wymagający mniejszej dawki zwykle rozpoczynają leczenie od dawki 0,25 mg dwa do trzech razy na dobę. Dawka ta może być powoli zwiększana w razie potrzeby i jeśli nie wystąpią żadne działania niepożądane.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

W przypadku problemów z nerkami lub wątrobą lekarz dostosuje dawkę leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Alprazolam Grindeks nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Lek Alprazolam Grindeks jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki należy popijać niewielką ilością płynu (np. pół szklanki wody). Tabletki mają linię podziału i można je podzielić na równe dawki.

Czas trwania leczenia

Ryzyko uzależnienia i nadużywania może zwiększać się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. Dlatego też lekarz przepisze możliwie najniższą skuteczną dawkę i czas trwania leczenia, a także będzie często oceniał potrzebę kontynuacji leczenia.

Maksymalny czas trwania leczenia nie powinien być dłuższy niż 2-4 tygodnie. Nie zaleca się długotrwałego leczenia. W przypadku stosowania leku dłużej niż kilka tygodni może wystąpić osłabienie działania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Alprazolam Grindeks

Jeśli pacjent zażył zbyt dużą ilość leku Alprazolam Grindeks, powinien natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala.

Objawami (łagodnego) przedawkowania mogą być senność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, niewyraźna mowa, spadek ciśnienia krwi, niestabilny chód/ruchy i osłabienie mięśni. W przypadku ciężkiego zatrucia może wystąpić głęboki sen, a nawet utrata przytomności, zaburzenia oddychania i zapaść krążeniowa. Niezbędne jest monitorowanie stanu pacjenta na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Oceny stopnia zatrucia powinien dokonać lekarz, który zadecyduje o środkach podjętych w celu jego leczenia.

Pominięcie zastosowania leku Alprazolam Grindeks

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku, należy zrezygnować z przyjęcia pominiętej dawki i kontynuować przyjmowanie leku Alprazolam Grindeks zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przerwanie stosowania leku Alprazolam Grindeks

Przed przerwaniem stosowania leku Alprazolam Grindeks należy zawsze skontaktować się z lekarzem, ponieważ dawkę należy zmniejszać stopniowo. W przypadku przerwania przyjmowania tabletek lub nagłego zmniejszenia dawki mogą wystąpić efekty „z odbicia”, które mogą powodować tymczasowe zwiększenie uczucia lęku lub niepokoju lub trudności ze snem. U niektórych osób mogą również wystąpić objawy „odstawienia” (patrz punkt 4. „Uzależnienie i objawy odstawienia”). Objawy te ustąpią, gdy organizm ponownie się dostosuje. W razie obaw lekarz może udzielić więcej informacji na ten temat. Lekarz będzie zatem stopniowo zmniejszał dawkę po zakończeniu leczenia. Zmniejszanie dawki odbywa się zgodnie z indywidualnymi potrzebami, ponieważ stopniowe odstawianie leku zależy od kilku czynników (np. czasu trwania leczenia i dawki dobowej). Należy zapytać lekarza o sposób stopniowego zmniejszania dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Powody, dla których należy natychmiast udać się do lekarza

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z tych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ konieczne będzie przerwanie leczenia. Lekarz poinformuje, w jaki sposób leczenie zostanie przerwane.

- Leczenie alprazolamem może powodować poważne skutki behawioralne lub psychiatryczne - na przykład uczucie wzburzenia, niepokój, agresywność, drażliwość, gwałtowny gniew, fałszywe przekonania, koszmary senne i omamy lub inne nieodpowiednie zachowania.
- Nagły świszczący oddech, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub swędzenie (zwłaszcza całego ciała).

Powody, dla których należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza

Należy jak najszybciej poinformować lekarza o wystąpieniu poniższych objawów, ponieważ może być konieczna zmiana dawki lub leczenia:

- Utrata pamięci (amnezja).
- Zażółcenie skóry i białek oczu (żółtaczka).

Uzależnienie i objawy odstawienia

Możliwe jest uzależnienie od leków takich jak alprazolam podczas ich przyjmowania, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia objawów odstawienia po zaprzestaniu leczenia. Objawy odstawienia występują częściej jeśli pacjent:

- nagle przerwał leczenie,
- przyjmował wysokie dawki,
- przyjmował ten lek przez długi czas,
- nadużywał alkoholu lub leków w przeszłości.

Może to powodować takie skutki, jak bóle głowy, bóle mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, dezorientacja, wahania nastroju, trudności ze snem i drażliwość.

W ciężkich przypadkach odstawienia mogą również wystąpić następujące objawy: nudności (mdłości), wymioty, potliwość, skurcze żołądka, skurcze mięśni, uczucie odrealnienia lub oderwania, wyjątkowa wrażliwość na dźwięk, światło lub kontakt fizyczny, drętwienie i mrowienie stóp i dłoni, omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, których nie ma na jawie), drżenie lub napady padaczkowe. Należy poinformować lekarza, jeśli objawy odstawienia nasilą się lub nie ustąpią.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić to:

Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób

- Depresja
- Senność i ospałość
- Gwałtowne, nieskoordynowane ruchy
- Niezdolność do zapamiętywania fragmentów informacji
- Niewyraźna mowa
- Zawroty głowy, uczucie pustki w głowie
- Bóle głowy
- Zaparcia
- Suchość w jamie ustnej
- Zmęczenie
- Drażliwość

Często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób

- Utrata apetytu
- Splątanie i dezorientacja
- Zmiany w popędzie seksualnym (mężczyźni i kobiety)
- Nerwowość, uczucie lęku lub wzburzenia
- Bezsenność (niezdolność do snu lub zaburzenia snu)
- Problemy z równowagą i niestabilność (podobne do uczucia upojenia), szczególnie w ciągu dnia
- Utrata czujności lub koncentracji
- Niezdolność do pozostania przytomnym, uczucie ospałości
- Chwiejność lub drżenie
- Podwójne lub niewyraźne widzenie
- Mdłości
- Reakcje skórne
- Zmiany masy ciała

Niezbyt często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób

- Uczucie podniecenia lub nadmiernego pobudzenia, które powoduje nietypowe zachowanie
- Omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją)
- Uczucie wzburzenia lub gniewu
- Wymioty
- Skurcze lub osłabienie mięśni
- Nietrzymanie moczu
- Ból skurczowy w dolnej części pleców i w udach, który może wskazywać na zaburzenia miesiączkowania
- Uzależnienie od leku

- Zespół odstawienia leku

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

- U kobiet nieregularne miesiączki lub wytwarzanie zbyt dużej ilości prolaktyny (hormonu stymulującego produkcję mleka)
- Uczucie wrogości lub agresji
- Zaburzone myśli
- Szarpiące i gwałtowne ruchy
- Nadpobudliwość
- Rozstrój żołądka
- Problemy z funkcjonowaniem wątroby (widoczne w badaniach krwi), zapalenie wątroby
- Brak równowagi układu nerwowego. Objawy mogą obejmować: szybkie bicie serca i niestabilne ciśnienie krwi (zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenia)
- Poważna reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła
- Obrzęk kostek, stóp lub palców
- Reakcja skórna spowodowana wrażliwością na światło słoneczne
- Trudności w oddawaniu moczu lub problemy z kontrolą pęcherza moczowego
- Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, co może również wpływać na wzrok
- Nadużywanie leku

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

5. Jak przechowywać lek Alprazolam Grindeks

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Alprazolam Grindeks

Substancją czynną leku jest alprazolam.

- Alprazolam Grindeks, 0,25 mg, tabletki
Każda tabletką zawiera 0,25 mg alprazolamu.
- Alprazolam Grindeks, 0,5 mg, tabletki

- Każda tabletkę zawiera 0,5 mg alprazolamu.
- Alprazolam Grindeks, 1 mg, tabletkę
- Każda tabletkę zawiera 1 mg alprazolamu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna; celuloza, mikrokrystaliczna (E 460); skrobia kukurydziana, wstępnie żelowana; sodu dokuzynian; sodu benzoesan (E 211); magnezu stearynian (E 572); krzemionka koloidalna bezwodna (E 551); żelaza tlenek czerwony (E 172) (*tylko tabletkę 0,5 mg*); indygotyna, lak (E 132) (*tylko tabletkę 1 mg*).

Jak wygląda lek Alprazolam Grindeks i co zawiera opakowanie

Alprazolam Grindeks, 0,25 mg to biała lub prawie biała, owalna tabletkę (10 mm x 5 mm) z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym napisem „0.25” po drugiej stronie.

Alprazolam Grindeks, 0,5 mg to jasnoróżowa do różowej, owalna tabletkę (10 mm x 5 mm) z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym napisem „0.5” po drugiej stronie.

Alprazolam Grindeks, 1 mg to jasnoniebieska do niebieskiej, owalna (10 mm x 5 mm) tabletkę z linią podziału po jednej stronie i wytłoczonym napisem „1” po drugiej stronie.

Lek Alprazolam Grindeks jest dostępny w blistrach z folii OPA/Aluminium/PVC//Aluminium zawierających 10, 20, 30, 50, 60 lub 100 tabletek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

AS GRINDEKS
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Łotwa
Tel: +371 67083205
Faks: +371 67083505
E-mail: grindeks@grindeks.com

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Belgia	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimés
Bułgaria	Алпразолам Гриндекс 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg таблетки
	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablets
Chorwacja	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Czechy	Alprazolam Grindeks
Dania	Alprazolam Grindeks
Estonia	Ixhalanex
Finlandia	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletit
Francja	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,25 mg, comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 0,5 mg, comprimé sécable
	ALPRAZOLAM GRINDEKS 1 mg, comprimé sécable
Grecja	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg δισκία
Hiszpania	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Holandia	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletten
Irlandia	Alprazolam Grindeks 250 microgram, 500 microgram, 1 mg tablets
Litwa	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletės
Luksemburg	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Pëllen
Łotwa	Ixhalanex 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletes
Niemcy	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg Tabletten
Polska	Alprazolam Grindeks

Portugalia	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimidos
Rumunia	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg comprimate
Słowacja	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablety
Słowenia	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tablete
Szwecja	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletter
Węgry	Alprazolam Grindeks 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg tabletta
Włochy	Alprazolam Grindeks

Data ostatniej aktualizacji ulotki: