

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CONDROMED 800 mg tabletki

Chondroitini natrii sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakiegokolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Condromed i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Condromed
3. Jak przyjmować lek Condromed
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Condromed
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Condromed i w jakim celu się go stosuje

Lek Condromed zawiera substancję czynną o nazwie chondroityny sodu siarczan.

Lek Condromed należy do innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwrheumatycznych. Jest wskazany w objawowym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Ten lek wykazuje opóźnione działanie, które może utrzymywać się po przerwaniu leczenia.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Condromed

Kiedy nie przyjmować leku Condromed

Jeśli pacjent ma uczulenie na chondroityny sodu siarczan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Condromed należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

- u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości zaburzenia lub niewydolność wątroby, nerek lub serca.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Condromed a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w szczególności o jednoczesnym przyjmowaniu kumarynowych leków przeciwzakrzepowych.

Condromed z jedzeniem i pić

Patrz punkt 3. „Jak przyjmować lek Condromed”.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Siarczan chondroityny może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Po przyjęciu leku mogą wystąpić zawroty głowy (patrz punkt 4). Jeśli tak się stanie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Condromed zawiera sód

Lek zawiera 73 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej tabletkce. Odpowiada to 3,8% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

3. Jak przyjmować lek Condromed

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka to 1 tabletkę przyjmowaną raz na dobę.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci z niewydolnością nerek, wątroby i serca

Leczenie pacjentów z niewydolnością nerek, wątroby i serca wymaga zachowania szczególnej ostrożności (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Instrukcja użycia

Tabletkę można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie posiłku lub po posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Condromed

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki tego leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Condromed

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją możliwie jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Condromed

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie.

Działania niepożądane wymienione poniżej zgłaszano z następującą częstością:

Rzadkie (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

- Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak ból brzucha, nudności, biegunka
- Zaczerwienienie skóry
- Wysypka

Bardzo rzadkie (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000 osób)

- Zawroty głowy
- Pokrzywka
- Świąd skóry
- Wyprysk
- Reakcja alergiczna
- Obrzęk

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

faks: +48 22 49 21 309

strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku.

5. Jak przechowywać lek Condromed

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania tego leku. Przechowywać w oryginalnym blisterze w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Condromed

Substancją czynną leku jest chondroityny sodu siarczan. Każda tabletką zawiera 800 mg chondroityny sodu siarczanu. Pozostały składnik to stearynian magnezu.

Jak wygląda lek Condromed i co zawiera opakowanie

Jest to biała lub prawie biała, podłużna, obustronnie wypukła tabletką o średnicy około 21 mm. Pudełka zawierają po 30 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

IBSA Farmaceutici Italia srl
Via Martiri di Cefalonia 2
26900 Lodi
Włochy
tel.: +48 22 653 68 60

Data ostatniej aktualizacji ulotki: